

Retatrutida

Sobrepeso

Tratamiento especializado

Inyectable semanal

GLP-1 + GIP + Glucagón

Perfil: Sobrepeso (IMC 27-29.9)



FASE 1 IDENTIFICACIÓN : ¿Para que sirve en tu caso?

Tu perfil: Sobrepeso (IMC 27-29.9)

En sobrepeso, retatrutida no se prescribe únicamente por el peso. Para este IMC es necesaria la presencia de al menos una condición de salud asociada. Su triple mecanismo GLP-1 + GIP + Glucagón la hace especialmente útil en este perfil porque además de reducir el apetito, mejora el metabolismo basal y tiene efectos positivos sobre glucosa, lípidos y presión arterial todos factores clave en las comorbilidades más comunes.

Pérdida de peso

Meta aproximado:10-15%

Control metabólico

Glucosa, lípidos y PA

Protección CV

Reducción de riesgo

Resultados típicos en sobrepeso

10-15%

Pérdida de peso con adherencia total

12-20

Semanas para resultados visibles

2-4 mg

Dosis efectiva frecuente en este perfil

⚠ Los resultados varían según riesgos asociados, adherencia y apoyo multidisciplinario. La paciencia y constancia son fundamentales.

FASE 2: TRATAMIENTO DETALLADO

[CLICK AQUÍ PARA CONOCER TU TRATAMIENTO](#)

FASE 3: MANTENIMIENTO: Para cuando llegaste a tu peso ideal

¿Qué pasa cuando llegaste a tu meta?

- En sobrepeso con retatrutida, la suspensión completa es el objetivo. Las dosis bajas de este perfil hacen que la reducción sea más sencilla y mejor tolerada que en perfiles de obesidad.

La suspensión completa es el objetivo en este perfil

En sobrepeso con condición asociada controlada, el tratamiento es temporal. Una vez alcanzado el peso saludable y con la comorbilidad bajo control, el objetivo es retirar el medicamento de forma gradual. Dado que las dosis en este perfil son las más bajas (2-4 mg), la reducción es la más rápida y mejor tolerada de todos los perfiles de retatrutida. Tiempo total estimado de tratamiento: 5 a 7 meses.

La dosis de mantenimiento la decide tu médico según tu respuesta individual. La siguiente tabla es orientativa, no un protocolo fijo.

Meta alcanzada → 4 sem

Mantener dosis actual

Semanas 5-8

Reducir a 2 mg

Semanas 9+

Suspensión bajo criterio

Tiempo total de reducción hasta suspensión: aproximadamente 4 meses. El proceso más corto de todos los perfiles.

Señales de alerta de rebote

Recuperar más de 3 kg en 2 semanas sin causa aparente, aumento de hambre intensa repentina, o retorno de antojos compulsivos.

Contacta a tu médico.

Retatrutida

Todo lo que necesitas saber para usarlo de forma segura

Inyectable semanal

GIP + GLP-1



1 ¿Para que sirve?

Controla el azúcar

Reduce el peso

Protege el corazón

No es insulina ni suplemento, trabaja con tu cuerpo para regular el azúcar el apetito y perder peso.

2 Esquema de dosis semanal.

Semanas 1-4

2 mg

Semanas 5-8

4 mg

Semanas 9-12

8 mg

Espera mínimo 4 semanas entre cada aumento. No te saltes este tiempo.

3 Cómo preparar y aplicar tu inyección.

Tu kit incluye: Frasco 1 (polvo blanco) + Frasco 2 (líquido disolvente).

1 Revisa el frasco

Una vez abierto deberá refrigerarse

2 Revisa el polvo

Debe ser blanco o blanquecino, sin grumos ni partículas.

3 Transfiere el líquido

Con la jeringa, pasa todo el líquido del frasco 2 al frasco 1.

4 Disuelve suavemente

Gira el frasco hasta disolver, ¡NUNCA AGITES!

5 Verifica la solución

Debe ser transparente y sin color. Si está turbia, deséchala.

6 Aplicación

Aplica de inmediato

¿Olvidaste aplicártela? Tienes 4 días. Si pasó más tiempo, omite esa dosis y continúa normal la próxima semana.

4 Cómo guardar tu medicamento.

Tiempo de vida

Hasta 30 días a $\leq 30^{\circ}\text{C}$... o en refrigeración.

Ya preparado

Úsalo de inmediato o refrigera máximo 24 h. Después deshecha.

Seguridad

Fuera del alcance de niños. No usar después de la fecha de caducidad.

5 Efectos secundarios.

Comunes y leves

- Náuseas, vómito, diarrea o estreñimiento.
- Dolor de estómago, acidez o eructos.
- Pérdida de apetito.
- Rojez o comezón en el sitio de la inyección.

Llama a tu médico si...

- Dolor fuerte en estómago o espalda.
- Bulto en el cuello o dificultad para tragar.
- Temblor, sudoración o hinchazón.
- Dolor de la vesícula y fiebre.

6 Qué evitar durante el tratamiento

No tomes alcohol en exceso porque aumenta el riesgo de azúcar baja.

No te automediques con otros tratamientos.

No conduzcas si sientes mareo o debilidad.

No usar durante el embarazo, cirugía de cualquier tipo o complicaciones médicas.