

Retatrutida

Obesidad mórbida

Tratamiento especializado

Inyectable semanal

GLP -1 + GIP + Glucagón

Perfil: Obesidad mórbida (IMC \geq 40)

FASE 1 IDENTIFICACIÓN : ¿Para que sirve en tu caso?

Tu perfil: Obesidad mórbida (IMC \geq 40)

En obesidad mórbida, retatrutida representa la opción farmacológica más potente disponible actualmente en investigación clínica. Su triple mecanismo actúa simultáneamente sobre tres receptores: GLP-1 (reduce el apetito), GIP (mejora la sensibilidad a la insulina) y Glucagón (aumenta el gasto energético en reposo). Esta combinación produce pérdidas de peso documentadas de hasta 24% en 48 semanas en estudios de Fase 2 — superiores a cualquier otro medicamento de su clase. En este perfil debe ir acompañada de seguimiento médico muy cercano, apoyo nutricional y evaluación psicológica.

Pérdida de peso

Meta: 20–24%

Salud metabólica

Mayor quema en reposo

Metabolismo

Mejora integral del bienestar

Resultados típicos en sobrepeso

24%

Pérdida de peso en 48 semanas con adherencia total

20 - 25%

Semanas para resultados significativos

24% +

Dosis máxima y de mantenimiento en este perfil

⚠ Los resultados varían según riesgos asociados, adherencia y apoyo multidisciplinario. La paciencia y constancia son fundamentales.

FASE 2: TRATAMIENTO DETALLADO

[**CLICK AQUÍ PARA CONOCER TU TRATAMIENTO**](#)

FASE 3: MANTENIMIENTO: Para cuando llegaste a tu peso ideal

¿Qué pasa cuando llegaste a tu meta?

En obesidad mórbida con retatrutida el tratamiento no termina al llegar al peso ideal. El mantenimiento prolongado es parte fundamental del protocolo en este perfil.

¿Por qué no se suspende de golpe?

Retatrutida activa simultáneamente tres sistemas hormonales que regulan el apetito, la insulina y el metabolismo basal. Al suspenderla abruptamente en obesidad mórbida, los tres sistemas vuelven a su estado previo, el apetito regresa con fuerza, el metabolismo baja y el peso puede recuperarse en pocas semanas. Los datos de Fase 2 muestran que pacientes que suspendieron sin reducción gradual recuperaron gran parte del peso en 20 semanas. El mantenimiento no es opcional.

En obesidad mórbida NO se recomienda intentar suspender completamente en el corto plazo. La dosis de mantenimiento prolongada (8–12 mg) es parte del tratamiento, no una fase transitoria.

Meta alcanzada → 4 sem

Mantener 12 mg (recomendado)

Semanas 5-8

8 mg (dosis alternativa)

Semanas 9-16

Reducir a 4 mg

Tiempo total de reducción hasta suspensión: aproximadamente 4 meses. El proceso más corto de todos los perfiles.

Señales de alerta de rebote

Recuperar más de 3 kg en 2 semanas, retorno del hambre intensa repentina o antojos compulsivos. Contacta a tu médico de inmediato — no esperes.

Retatrutida

Todo lo que necesitas saber para usarlo de forma segura

Inyectable semanal

GIP + GLP-1



1 ¿Para que sirve?

Controla el azúcar

Reduce el peso

Protege el corazón

No es insulina ni suplemento, trabaja con tu cuerpo para regular el azúcar el apetito y perder peso.

2 Esquema de dosis semanal.

Semanas 1-4

2 mg

Semanas 5-8

4 mg

Semanas 9-12

8 mg

Semana 13 +

12 mg (mantenimiento)

Espera mínimo 4 semanas entre cada aumento. No te saltes este tiempo.

3 Cómo preparar y aplicar tu inyección.

Tu kit incluye: Frasco 1 (polvo blanco) + Frasco 2 (líquido disolvente).

1 Revisa el frasco

Una vez abierto deberá refrigerarse

2 Revisa el polvo

Debe ser blanco o blanquecino, sin grumos ni partículas.

3 Transfiere el líquido

Con la jeringa, pasa todo el líquido del frasco 2 al frasco 1.

4 Disuelve suavemente

Gira el frasco hasta disolver, ¡NUNCA AGITES!

5 Verifica la solución

Debe ser transparente y sin color. Si está turbia, deséchala.

6 Aplicación

Aplica de inmediato

¿Olvidaste aplicártela? Tienes 4 días. Si pasó más tiempo, omite esa dosis y continúa normal la próxima semana.

4 Cómo guardar tu medicamento.

Tiempo de vida

Hasta 30 días a $\leq 30^{\circ}\text{C}$... o en refrigeración.

Ya preparado

Úsalo de inmediato o refrigera máximo 24 h. Después deshecha.

Seguridad

Fuera del alcance de niños. No usar después de la fecha de caducidad.

5 Efectos secundarios.

Comunes y leves

- Náuseas, vómito, diarrea o estreñimiento.
- Dolor de estómago, acidez o eructos.
- Pérdida de apetito.
- Rojez o comezón en el sitio de la inyección.

Llama a tu médico si...

- Dolor fuerte en estómago o espalda.
- Bulto en el cuello o dificultad para tragar.
- Temblor, sudoración o hinchazón.
- Dolor de la vesícula y fiebre.

6 Qué evitar durante el tratamiento

No tomes alcohol en exceso porque aumenta el riesgo de azúcar baja.

No te automediques con otros tratamientos.

No conduzcas si sientes mareo o debilidad.

No usar durante el embarazo, cirugía de cualquier tipo o complicaciones médicas.