

Semaglutida

Obesidad mórbida

Tratamiento especializado

Inyectable semanal

GIP + GLP-1

Perfil: Obesidad mórbida



FASE 1 IDENTIFICACIÓN : ¿Para que sirve en tu caso?

Tu perfil: Obesidad mórbida (IMC \geq 40)

En obesidad mórbida, semaglutida actúa como agonista GLP-1. Imita una hormona natural que reduce el apetito, enlentece el vaciamiento gástrico y mejora el control metabólico.

Este perfil requiere supervisión médica

Pérdida de peso

Meta aproximada: 15 -17%

Salud metabólica

Control de comorbilidades

Calidad de vida

Mejora integral del bienestar

Resultados típicos en Obesidad mórbida

15 - 17%

Pérdida de peso con adherencia total

16 - 24

Semanas para resultados significativos

7.5-10 mg

Dosis de mantenimiento objetivo

Los resultados varían según riesgos asociados, adherencia y apoyo multidisciplinario. La paciencia y constancia son fundamentales.

FASE 2: TRATAMIENTO DETALLADO

[CLICK AQUÍ PARA CONOCER TU TRATAMIENTO](#)

FASE 3: MANTENIMIENTO: Para cuando llegaste a tu peso ideal

¿Qué pasa cuando llegaste a tu meta?

En obesidad mórbida el tratamiento no se suspende abruptamente. La evidencia indica que mantener la dosis completa protege mejor contra el rebote que reducirla.

Por qué no se suspende de golpe?

La semaglutida regula activamente el apetito y el metabolismo a través del eje GLP-1. Al suspenderla abruptamente, el apetito regresa con fuerza porque el cuerpo no ha consolidado nuevos patrones metabólicos. En obesidad mórbida, la evidencia clínica indica que la mayoría de pacientes requiere mantenimiento prolongado (en muchos casos indefinido) a la dosis de 2.4 mg o a la máxima tolerada.

A diferencia de otros perfiles, en obesidad mórbida **NO se recomienda reducir la dosis al llegar al peso ideal.**

Esquema de mantenimiento orientativo

Meta alcanzada indefinido

Mantener 2.4 mg (recomendado)

Si no se tolera 2.4 mg

1.7 mg (dosis alternativa)

Reducción solo si médico indica

Gradual, nunca de golpe

En obesidad mórbida, suspender semaglutida sin un plan médico estructurado puede provocar recuperación del peso perdido en 12-20 semanas. El mantenimiento es parte del tratamiento, no opcional.

Señales de alerta de rebote

Recuperar más de 3 kg en 2 semanas sin causa aparente, aumento de hambre intensa repentina, o retorno de antojos compulsivos. Contacta a tu médico.

Semaglutida

Todo lo que necesitas saber para usarlo de forma segura

Inyectable semanal

GIP + GLP-1



1 ¿Para que sirve?



Controla el azúcar



Reduce el peso



Protege el corazón

No es insulina ni suplemento, trabaja con tu cuerpo para regular el azúcar el apetito y perder peso.

2 Esquema de dosis semanal.

Semanas 1-4

0.25 mg

Semanas 5-8

0.5 mg

Semanas 9-12

1 mg

Semana 13 +

1.7 mg

Semana 13 +

2.4 mg (mantimiento)

Espera mínimo 4 semanas entre cada aumento. No te saltes este tiempo.

3 Cómo preparar y aplicar tu inyección.

Tu kit incluye: Frasco 1 (polvo blanco) + Frasco 2 (líquido disolvente).

1

Revisa el frasco

Una vez abierto deberá refrigerarse

2

Revisa el polvo

Debe ser blanco o blanquecino, sin grumos ni partículas.

3

Transfiere el líquido

Con la jeringa, pasa todo el líquido del frasco 2 al frasco 1.

4

Disuelve suavemente

Gira el frasco hasta disolver, ¡NUNCA AGITES!

5

Verifica la solución

Debe ser transparente y sin color. Si está turbia, deséchala.

6

Aplicación

Aplica de inmediato o refrigera (2-8 °C) máximo 24 h.

¿Olvidaste aplicártela? Tienes 4 días. Si pasó más tiempo, omite esa dosis y continúa normal la próxima semana.

4 Cómo guardar tu medicamento.

Tiempo de vida

Hasta 30 días a ≤30 °C... o en refrigeración.

Ya preparado

Úsalo de inmediato o refrigera máximo 24 h. Después deshecha.

Seguridad

Fuera del alcance de niños. No usar después de la fecha de caducidad.

5 Efectos secundarios.

Comunes y leves

- Náuseas, vómito, diarrea o estreñimiento.
- Dolor de estómago, acidez o eructos.
- Pérdida de apetito.
- Rojez o comezón en el sitio de la inyección.

Llama a tu médico si...

- Dolor fuerte en estómago o espalda.
- Bulto en el cuello o dificultad para tragar.
- Temblor, sudoración o hinchazón.
- Dolor de la vesícula y fiebre.

6 Qué evitar durante el tratamiento

No tomes alcohol en exceso porque aumenta el riesgo de azúcar baja.

No te automediques con otros tratamientos.

No conduzcas si sientes mareo o debilidad.

No usar durante el embarazo, cirugía de cualquier tipo o complicaciones médicas.